



سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳	رشته علوم تجربی	نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۱۰ صبح
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷	تعداد صفحات: ۴	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۱			
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir			

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی و جذر و درصد) مجاز است.

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	بارم
۱	نمودار سرعت - زمان متحرکی در شکل زیر نشان داده شده است. درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را با کلمات «درست» یا «نادرست» در پاسخ‌نامه مشخص کنید. الف) در بازه زمانی t_2 تا t_3 بردار شتاب در جهت محور x است. ب) در بازه زمانی t_1 تا t_2 حرکت کندشونده است. پ) در لحظه t_2 شتاب صفر است. 	۰/۷۵
۲	سرعت متحرکی در لحظه $t = 0 \text{ s}$ به صورت $\vec{v}_0 = (10 \text{ m/s})\vec{i}$ و شتاب ثابت آن $\vec{a} = (-1 \text{ m/s}^2)\vec{i}$ است. در بازه زمانی صفر تا 20 s، تندی حرکت آن چگونه تغییر می‌کند.	۱
۳	نمودار مکان - زمان متحرکی که در امتداد محور x با شتاب ثابت در حرکت می‌باشد، به صورت سهمی شکل زیر است. الف) معادله مکان - زمان این متحرک را بنویسید. ب) مسیر حرکت متحرک در امتداد محور x را رسم کنید. 	۱/۵ ۰/۲۵
۴	چتربازی در هوای آرام و در امتداد قائم چتر خود را باز می‌کند و در ارتفاع ۶۰۰ متری سطح زمین به تندی حدی خود که 5 m/s است می‌رسد. چند ثانیه طول می‌کشد تا چتر باز به سطح زمین برسد؟	۰/۵





ادامه سؤالات در صفحه دوم

سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳	رشته علوم تجربی	نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۱۰ صبح
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷	تعداد صفحات: ۴	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۱			
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir			



ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	بارم
۵	به پرسش های زیر پاسخ دهید: (الف) در شکل مقابل، جسم بر روی سطح افقی ساکن است. نیروی اصطکاک جسم با سطح چند نیوتون است؟ (با ذکر دلیل) (ب) شخصی به جرم 60 kg روی یک ترازوی فنری، داخل آسانسور ایستاده است. اگر ترازو عدد 500 N را نشان دهد، در این صورت کدام گزینه صحیح است؟ (۱) حرکت آسانسور کندشونده رو به پایین است. (۲) حرکت آسانسور تندشونده رو به بالا است. (۳) حرکت آسانسور می تواند تندشونده رو به پایین یا کندشونده رو به بالا باشد.	۰/۵ ۰/۲۵
۶	اگر مطابق شکل مکعب چوبی را با تندی 20 m/s افقی پرتاب کنیم، پس از طی مسافت 40 m متوقف می شود. ضریب اصطکاک جنبشی سطح با جسم چقدر است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)	۱/۵
۷	مطابق شکل فنر سبکی از سقف آویزان است. اگر فنر را بکشیم تا طول آن 12 cm شود، نیروی کشسانی فنر 2 N است و اگر فنر را فشرده کنیم تا طول آن 7 cm شود نیروی کشسانی فنر 3 N می شود. طول عادی فنر چند سانتی متر است؟	۱
۸	اگر به اندازه شعاع کره زمین از سطح زمین دور شویم، شتاب گرانشی چند متر بر مربع ثانیه می شود؟ (شتاب گرانشی در سطح زمین را 10 m/s^2 فرض کنید).	۱
۹	(الف) دوره تناوب سامانه جرم – فنر با جذر به طور مستقیم متناسب است. (ب) اگر ناظر به طرف چشمه صوت حرکت کند، در مقایسه با ناظر ساکن، بسامد صوتی که می شنود می یابد. (پ) موج صوتی در منتشر نمی شود. (ت) ارتفاع صوت است که گوش انسان درک می کند.	۱
۱۰	با طراحی آزمایشی، چگونگی اندازه گیری شتاب گرانشی زمین را به کمک یک آونگ ساده شرح دهید.	۱
۱۱	به پرسش های زیر پاسخ بدهید. (الف) چرا رنگ های نور سفید پس از عبور از منشور از هم جدا می شوند؟ (ب) یک کاربرد از مکان یابی پژواکی را بنویسید.	۰/۵ ۰/۲۵

ادامه سؤالات در صفحه سوم



سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳	رشته علوم تجربی	نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۱۰ صبح
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷	تعداد صفحات: ۴	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۱			
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir			

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	بارم
۱۲	معادله مکان - زمان یک نوسانگر هماهنگ ساده در SI به صورت $x = ۰/۲ \cos ۲۰\pi t$ است. الف) در لحظه $t = \frac{1}{6}$ s اندازه شتاب نوسانگر چند متر بر مربع ثانیه است؟ ب) اگر جرم نوسانگر ۲۰ g باشد، انرژی مکانیکی آن چند ژول است؟ $(\pi^2 = ۱۰ \text{ و } \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2})$	۰/۷۵ ۰/۷۵
۱۳	شکل الف مربوط به نقش یک موج مکانیکی در یک محیط در لحظه $t_1 = ۰$ s است و در لحظه $t_2 = ۰/۱$ s برای اولین بار شکل موج به صورت شکل ب می شود. بیشینه تندی هر ذره از محیط انتشار موج در SI چقدر است؟ $(\pi = ۳)$	۱/۲۵
الف  ب 		
۱۴	الف) در شکل زیر مسیر پرتو نور را رسم کنید و زاویه بازتابش از آینه M_2 را حساب کنید. ب) در شکل زیر نور از هوا وارد محیط شفاف ۲ شده است. اگر تندی نور در هوا 3×10^8 m/s باشد، تندی نور در محیط ۲ چه قدر است؟ $(\sin ۳۷^\circ = ۰/۶ \text{ و } \sin ۵۳^\circ = ۰/۸)$	۰/۵ ۰/۷۵
 		

(۴)

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		رشته علوم تجربی		راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس فیزیک ۳	
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه		تعداد صفحات: ۴		تاریخ امتحان: ۱۴۰۱ / ۱۰ / ۱۷	
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۱			
بارم	پاسخها				ردیف
۰/۷۵	(هر مورد صحیح ۰/۲۵) ص ۲۴				۱
۱	$v = at + v_0$ (۰/۲۵) $v = -t + 10$ (۰/۲۵)  (رسم شکل ۰/۲۵) ابتدا تندی متحرک کاهش یافته و سپس افزایش می یابد. (۰/۲۵) ص ۲۱				۲
۱/۷۵	$\Delta x = \frac{v+v_0}{2} \Delta t$ (۰/۲۵) $a = \frac{v-v_0}{t}$ (۰/۲۵) $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$ (۰/۲۵) $-50 = \frac{v+v_0}{2} 10 \Rightarrow v_0 = -10 \text{ m/s}$ (۰/۲۵) $a = \frac{v-(-10)}{10} = 1 \text{ m/s}^2$ (۰/۲۵) $x = \frac{1}{2}t^2 - 10t$ (۰/۲۵) (رسم صحیح شکل ۰/۲۵)  ص ۲۵ و ۲۶				۳
۰/۵	$\Delta y = v \Delta t$ (۰/۲۵) ص ۱۳ و ۱۴ $600 = 5 \Delta t \Rightarrow \Delta t = 120 \text{ s}$ (۰/۲۵)				۴
۰/۷۵	(الف) بنا به قانون اول نیوتون چون جسم در حال سکون است، پس نیروهای وارد بر آن متوازن هستند و اندازه نیروی اصطکاک ایستایی برابر است با اندازه نیروی محرکی که در راستای سطح به جسم وارد می شود (۰/۲۵). $f_s = 0 \text{ N}$ (۰/۲۵) (ب) گزینه ۳ (۰/۲۵) ص ۳۸ و ۳۶				۵

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس فیزیک ۳		رشته علوم تجربی		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱ / ۱۰ / ۱۷		تعداد صفحات: ۴		مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۱				مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	
۶	الف)	$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x \quad (۰/۲۵) \quad 0^2 - ۲۰^2 = 2a \times ۴۰ \Rightarrow a = -۵ \text{ m/s}^2 \quad (۰/۲۵)$ $a = -\frac{f_k}{m} \quad (۰/۲۵) \quad a = -\frac{\mu_k F_N}{m} \quad (۰/۲۵) \quad a = -\frac{\mu_k mg}{m} = -\mu_k g \quad (۰/۲۵)$ $a = -۵ = -\mu_k g \Rightarrow \mu_k = ۰/۵ \quad (۰/۲۵)$ ص ۱۸ و ۴۰			
۷		$F_e = kx \quad (۰/۲۵) \quad ۲ = k(۱۲ - L_0) \quad (۰/۲۵) \quad ۳ = k(L_0 - ۷) \quad (۰/۲۵)$ $\frac{۲}{۳} = \frac{۱۲ - L_0}{L_0 - ۷} \Rightarrow L_0 = ۱۰ \text{ cm} \quad (۰/۲۵)$ ص ۴۱			
۸		$g = \frac{GM_e}{r^2} \quad (۰/۲۵) \quad \frac{g_2}{g_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \quad (۰/۲۵)$ $\frac{g_2}{۱۰} = \left(\frac{R_e}{۲R_e}\right)^2 \quad (۰/۲۵) \quad g_2 = ۲/۵ \text{ m/s}^2 \quad (۰/۲۵)$ ص ۴۹			
۹	الف) جرم وزنه	ب) افزایش	پ) خلأ	ت) بسامدی	(هر مورد صحیح ۰/۲۵) ص ۵۷ و ۷۶ و ۶۸ و ۷۴
۱۰	ابتدا طول آونگ ساده را اندازه گیری می کنیم (۰/۲۵) و سپس آن را با زاویه کوچک به نوسان درمی آوریم و مدت زمان چند نوسان کامل را اندازه گیری می کنیم (۰/۲۵). به کمک رابطه $T = \frac{t}{n}$ دوره را محاسبه می کنیم (۰/۲۵) با قرار دادن دوره در رابطه $T = ۲\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ شتاب گرانشی (g) را محاسبه می کنیم (۰/۲۵). ص ۵۹				
۱۱	الف) زیرا ضریب شکست منشور برای طول موج های مختلف متفاوت است در نتیجه انحراف آنها هنگام عبور از منشور برابر نیست. (۰/۵) ب) دستگاه سونار کشتی ها. (۰/۲۵) ص ۷۹ و ۸۷				
۱۲	الف)	$x = ۰/۲ \cos ۲\pi t \xrightarrow{t=\frac{1}{۶}\text{s}} x = ۰/۲ \cos \frac{\pi}{۳} = ۰/۱ \text{ m} \quad (۰/۲۵)$ $ a = \omega^2 x \quad (۰/۲۵) \quad a = ۴۰۰\pi^2 \times ۰/۱ = ۴۰۰ \text{ m/s}^2 \quad (۰/۲۵)$ $E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \quad (۰/۲۵) \quad E = \frac{1}{2} \times ۰/۰۲ \times ۴۰۰\pi^2 \times ۰/۰۴ \quad (۰/۲۵) \quad E = ۱/۶ \text{ J} \quad (۰/۲۵)$ ب) (۰/۲۵) ص ۸۹			

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	رشته علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس فیزیک ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحات: ۴	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱ / ۱۰ / ۱۷
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۱	
۱/۲۵	۱۳ با توجه به شکل، میزان پیش روی موج در بازه زمانی t_1 تا t_2 است. $\frac{T}{2} = t_2 - t_1 = 0.1 \text{ s} \Rightarrow T = 0.2 \text{ s} \quad (0.25)$ $\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (0.25) \quad \omega = 10\pi \text{ rad/s} \quad (0.25)$ $v_{\max} = A\omega \quad (0.25) \quad v_{\max} = 1/5 \times 10^{-2} \times 10 \times 3 = 0.45 \text{ m/s} \quad (0.25)$ ص ۶۵	
۱/۲۵	۱۴ الف) رسم صحیح شکل ۰/۲۵ نمره و تعیین زاویه بازتابش از آینه M_2، ۰/۲۵ نمره.  (ب)  $\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{v_2}{v_1} \quad (0.25) \quad \frac{\sin 37^\circ}{\sin 53^\circ} = \frac{v_2}{3 \times 10^8} \quad (0.25) \quad v_2 = 2/25 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (0.25)$ ص ۹۳ و ۸۵	
۱/۷۵	۱۵ الف) ۱- افزایش انرژی جنبشی فوتوالکترون ها (۰/۲۵) ۲- افزایش تعداد فوتوالکترون ها (۰/۲۵) ب) ۱- یک فوتون وارد می شود و دو فوتون خارج می شود. (۰/۲۵) ۲- فوتون گسیلی با فوتون فرودی هم جهت است. (۰/۲۵) پ) ۲ (۰/۲۵) ت) ۱) ${}_{82}^{211}\text{Pb} \rightarrow {}_{83}^{211}\text{Bi} + {}_{-1}^0e^-$ ۲) ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$ (هر مورد ۰/۲۵) ص ۱۲۲ و ۱۱۰ و ۱۱۳ و ۱۱۶	
۰/۵	۱۶ $E_n = -\frac{E_R}{n^2} \quad (0.25) \quad E_3 = -\frac{13.6}{3^2} \approx -1.5 \text{ eV} \quad (0.25)$ ص ۱۰۶	

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		رشته علوم تجربی		راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس فیزیک ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه		ساعت شروع: ۱۰ صبح	تعداد صفحات: ۴	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱ / ۱۰ / ۱۷
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۱		
۱	$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ (۰/۲۵) $\frac{1}{\lambda} = 0.01 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{\infty} \right)$ (۰/۲۵) $\lambda = 400 \text{ nm}$ (۰/۲۵) این طول موج در ناحیه فرابنفش قرار دارد. (۰/۲۵) ص ۱۰۲			۱۷
۰/۷۵	$E = \frac{nhc}{\lambda}$ (۰/۲۵) $P = \frac{2 \times 10^{21} \times 6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{660 \times 10^{-9} \times 60}$ (۰/۲۵) ص ۱۲۲	$P = 10 \text{ W}$ (۰/۲۵)	$P = \frac{nhc}{\lambda t}$	۱۸
۱	$N = \frac{N_0}{r^n}$ (۰/۲۵) $3 \times 10^{10} = \frac{12 \times 10^{10}}{r^n} \Rightarrow \frac{t}{T_A} = n_A = 2$ (۰/۲۵) $\frac{T_A}{T_B} = \frac{1}{2}$ (۰/۲۵) ص ۱۲۰	$3 \times 10^{10} = \frac{6 \times 10^{10}}{r^n} \Rightarrow \frac{t}{T_B} = n_B = 1$ (۰/۲۵)		۱۹
۲۰	جمع نمرات مصححین گرامی، برای پاسخ های صحیح دیگر نیز نمره لازم در نظر گرفته شود.			