

# جمع بندی ریاضی دوازدهم تجربی

## فصل ششم هندسه

علی جبرا | سایت تخصصی آموزش ریاضی

**ALIGEBRA.COM**

۰۹۱۲۷۷۴۴۲۸۱ – ۰۹۱۲۷۷۴۴۳۸۹

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت **Algebra.com** است و هرگونه استفاده از این اثر و انتشار آن در پایگاه های مجازی بدون کسب مجوز منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

$$\rightarrow \text{اسوانه} \quad V = \pi r^2 h$$

$$\rightarrow V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \quad \text{مخروط}$$

$$\rightarrow V = \frac{4}{3} \pi r^3 \quad \text{دایره}$$


دوران

اسوانه حس میل مربع ۱)

۲) مخروط حس مدع

۳) دایره حس نز


۱- مطابق شکل وتر مثلث به معادله  $1 - 2x = y$ , با شرط  $0 \leq x \leq 3$  مفروض است. اگر مثلث را حول محور  $y$ ها دوران دهیم، حجم شکل حاصل کدام است؟



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$\rightarrow V = \frac{1}{3} \pi \times 9 \times 5 = 15\pi$$

~~✓~~




$$\text{اکسیز} e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

$$A \left|_{\beta}^{\alpha+a} \right. \quad A' \left|_{\beta}^{\alpha-a} \right. \quad F \left|_{\beta}^{\alpha+c} \right. \quad F' \left|_{\beta}^{\alpha-c} \right.$$

$$B \left|_{\beta+b}^{\alpha} \right. \quad B' \left|_{\beta-b}^{\alpha} \right.$$

۲- چهار خط به معادله  $x = 1$ ،  $x = 6$ ،  $y = -1$  و  $y = 3$  مماس هستند. اگر  $P$  نقطه‌ای واقع بر این

ییضی باشد، به طوری که  $P$ ،  $F'$  و  $F$  رأس‌های یک مثلث باشند، محیط این مثلث کدام است؟




$$PF' + PF = Pa$$

$$\text{چی} = Pa + PC = ?$$


$$\begin{cases} Pa = \omega \\ Pb = \mu \end{cases} \rightarrow PC = \underline{\underline{\mu}}$$

$$\underline{\underline{\omega}} = \omega + \mu = 1$$

$$\rightarrow C = \sqrt{a^2 - b^2}$$



۳- در بیضی شکل زیر طول  $A'H$  چه قدر است؟



$$\begin{cases} F \mid r \\ B \mid o \\ B \mid r \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = r \\ a = \omega \end{cases} \rightarrow c = f$$

$$\begin{cases} \text{با}: mx + fy - 1 = 0 \\ A' \mid -\omega \end{cases}$$

$$m_{BF} = \frac{\omega - o}{o - f} = \frac{-r}{f}$$

$$A'H = \frac{|-\omega + o - 1|}{\sqrt{o^2 + f^2}} = \omega / f$$

$$\text{معادل خط}: y - o = \frac{-r}{f}(x - f) \rightarrow y = -rx + 1/r$$

۴- مجموع فواصل نقطه‌ی P روی بیضی از دو نقطه‌ی ثابت N و M به طول‌های ۳- و ۴ روی محور  $x$ ها برابر ۹ است. اندازه‌ی قطر کوچک

$$F \int_0^F \quad F' \int_0^{-3} \rightarrow FF' = PC \rightarrow PC = V \rightarrow C = \frac{V}{P}$$

این بیضی کدام است؟


$$PF + PF' = Pa \rightarrow Pa = 9 \rightarrow a = \frac{9}{P}$$

$$a^r + b^r = c^r \rightarrow b = \sqrt{a^r - c^r} = \sqrt{\frac{11}{F} - \frac{81}{F}} = \sqrt{\frac{11}{F}} = \sqrt{\lambda}$$

$$\rightarrow \overline{BB'} = \overline{Bb} = \sqrt{\lambda} = F\sqrt{P}$$

۵- خط به معادله  $x + 2y = 3$  میکند؟

$$\begin{array}{|c|c|} \hline & 2 \\ \hline -1 & \\ \hline \end{array}$$



$$m_1 = -\frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad m_2 = +\frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = -1 \\ m = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$y + 1 = \frac{1}{2}(x - 2)$$

$$\begin{array}{ccc} \text{با عرضه} & | = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2} & x = \frac{5}{2}y + 5 \\ y = 0 & & \end{array}$$

۶- در یک بیضی با کانون‌های  $F' \left( -1, \frac{1}{4} \right)$  و  $F \left( \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$  که در آن طول قطر بزرگ برابر ۶ واحد است، کدام گزینه وضعیت قرارگیری نقطه را به درستی نشان می‌دهد؟

۴ مرکز بیضی

۳ روی بیضی

۲ بیرون بیضی

۱ درون بیضی

$$MF + MF' = ۶ \rightarrow \text{روی بیضی}$$

$$MF = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$$

$$MF + MF' > ۶ \rightarrow \text{بیرون بیضی}$$

$$MF' = \sqrt{۰+f} = ۲$$

$$MF + MF' < ۶ \rightarrow \text{داخل بیضی}$$

$$AA' = ۶ = ۶ \rightarrow AA' = ۶$$

$$MF + MF' = \sqrt{10} + 2 < 6 = AA'$$

۷- در یک بیضی افقی با مرکز  $W \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} \\ -1 \end{pmatrix}$ ، طول قطر کوچک و خروج از مرکز آن به ترتیب ۶ واحد و  $\frac{4}{5}$  است. کدام نقطه زیر بر روی این بیضی قرار ندارد؟

$$\begin{pmatrix} -9 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \textcircled{1}$$

$$\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \textcircled{2}$$

$$\begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \textcircled{3}$$


$$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \textcircled{4}$$

$$BB' = 9 = ۳b \rightarrow b = ۳$$

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \rightarrow \frac{e}{\omega} = \sqrt{1 - \frac{9}{a^2}} \rightarrow \frac{9}{a^2} = \frac{1}{\omega^2} \rightarrow a^2 = ۹\omega^2 \rightarrow a = \omega$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{۹\omega^2 - ۹} = \omega \rightarrow C = \omega$$

$$A' \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} -9 \\ -1 \end{pmatrix} \quad F \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad F \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad B \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad B' \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}$$



۸- مختصات دو سر قطر کوچک یک بیضی  $\left| \begin{array}{cc} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{array} \right|$  است. این بیضی از نقطه  $\left| \begin{array}{c} -4 \\ 2 \end{array} \right|$  می‌گذرد، خروج از مرکز آن کدام است؟

$$B \left/ \begin{array}{c} -1 \\ \omega \end{array} \right.$$


$$B' \left/ \begin{array}{c} -1 \\ 1 \end{array} \right.$$

$$BB' = 2b = 2 \rightarrow b = 1$$

$$\omega \left/ \begin{array}{c} -1 \\ 2 \end{array} \right.$$


$$A' \left/ \begin{array}{c} -1 \\ \gamma \end{array} \right.$$

$$a = \mu$$



$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

۹- در یک بیضی، فاصله یک رأس کانونی از یک رأس ناکانونی، نصف مجموع فاصله کانونی و اندازه قطر بزرگ است. خروج از مرکز این بیضی



$$\sqrt{a^2 + b^2}$$

کدام است؟

$$e = \frac{c}{a} = ?$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \frac{1}{r} (\gamma c + \gamma a) = a + c \rightarrow a^2 + b^2 = a^2 + c^2 + 2ac$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow b^2 = a^2 - c^2 \rightarrow a^2 - c^2 = c^2 + 2ac$$
$$\div a^2 \rightarrow 1 - e^2 = e^2 + 2e \rightarrow e^2 + 2e - 1 = 0$$

$$\Delta = F - f(r)(-1) = 12 \rightarrow e = \frac{-r + \sqrt{r^2}}{r} = \frac{\sqrt{r^2 - 1}}{r}$$

$$(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = R^2 \quad \begin{matrix} 0/\alpha \\ 0/\beta \end{matrix} \quad \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = R$$

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

$$R^2 = \frac{a^2 + b^2 - 4c}{4}$$

$$\begin{matrix} 0/-\alpha \\ 0/-\beta \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} f_x' = 0 \\ f_y' = 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0/\alpha \\ 0/\beta \end{matrix}$$

$$R^2 = \alpha^2 + \beta^2 - c$$

آنکه: ۱)  $y = x$   
۲)  $R > 0$

$$R > 0$$

۱۰- شعاع دایره‌ای که از سه نقطه با مختصات  $(0, 0), (-2, 4), (2, 1)$  می‌گذرد کدام است؟

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

$$A \Big|_0 \rightarrow 0 + 0 + 0 + 0 + c = 0 \rightarrow c = 0$$


$$B \Big|_{(-2, 4)} \rightarrow 4 + 16 - 4a + 4b = 0 \rightarrow -4a + 4b = -20$$

$$C \Big|_{(2, 1)} \rightarrow 1 + 1 + 2a + b = 0 \rightarrow 2a + b = -2$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = -2 \end{cases}$$

$$R = \frac{a + b - \sqrt{c}}{\gamma} = \frac{0 + (-2) - 0}{\gamma} \rightarrow R = \frac{-2}{\gamma} = -\frac{2}{\gamma}$$

۱۱- به ازای کدام مقدار  $a$ ، زاویه‌ی بین خط مماس بر دایره‌ی  $x^2 + y^2 - 2x + y = 1$  در نقطه‌ی تلاقی آن‌ها،  $90^\circ$  درجه است؟




$$\omega \left| \begin{array}{l} -\frac{a}{r} \\ -\frac{b}{r} \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha = +1 \\ \beta = \frac{-1}{r} \end{array} \right.$$


$$\begin{aligned} x &= 1 \\ y &= -\frac{1}{r} \\ 1^2 - 1 &= a \\ a &= r \end{aligned}$$

وضعیت بین دو دایره


$$OO' = L$$



$$L > r + r'$$




$$L = r + r'$$




$$r - r' < L < r + r'$$

۳




$$L = r - r'$$

۴



$$L < r - r'$$



$$L = 0$$

۱۲- دو دایره به معادلات  $x^2 + y^2 + 8x - 4y + 12 = 0$  و  $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 1$  نسبت به هم کدام وضع را دارند؟

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 1 = 0 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} O / \alpha = \frac{-2}{2} = -1 \\ \beta = -\frac{4}{2} = -2 \end{array} \right.$$

$$R' = \frac{r^2 + r^2 + 1^2}{r} = 1 + 9 + 1 \rightarrow R = \sqrt{11} = \sqrt{r}$$

$$x^2 + y^2 + 8x - 4y + 12 = 0 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} O' / \alpha = -\frac{8}{2} = -4 \\ \beta = \frac{4}{2} = 2 \end{array} \right.$$

$$R' = \frac{r^2 + r^2 - 1^2}{r} = 16 + 4 - 1 \rightarrow R' = \sqrt{19} = \sqrt{r}$$

$$L = OO' = \sqrt{r^2 + r^2} = \sqrt{2r}$$

$$\rightarrow L = \sqrt{2r} = R + R' = \sqrt{r} + \sqrt{19}$$

۱۳- هر خط قائم بر یک دایره، از نقطه  $(-2, 1)$  می‌گذرد. این دایره بر خط به معادله  $x - y = 1$  مماس است. شعاع دایره کدام است؟

$$%$$


$$x - y - 1 = 0$$

$$A/\alpha$$

$$ax + by + c = 0$$



$$L = \frac{|a\alpha + b\beta + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$L = \frac{|-2 - 1 - 1|}{\sqrt{1+1}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$



$$x - y - 1 = 0$$

۱۴- دایره‌ای از دو نقطه‌ی  $(1, 0)$  و  $(3, 0)$  گذشته و معادله‌ی یک قطر آن به صورت  $x - y = 2$  است. شعاع این دایره کدام است؟



$$\begin{cases} \alpha = x \\ \beta = \pi - x \end{cases}$$


$$R = \sqrt{1 + k^2} = \sqrt{\alpha}$$

$$OA = OB \rightarrow \sqrt{(x-1)^2 + (x-0)^2} = \sqrt{(x-0)^2 + (x-3)^2}$$

$$(x-1)^2 + (x-0)^2 = x^2 + (x-3)^2$$

$$x^2 - 2x + 1 = x^2 - 6x + 9 \rightarrow x = 1$$

۱۵- به ازای کدام مقدار  $m$  خط  $x^2 + y^2 - 4x + 6y = 0$  بر دایره  $2x - 3y + m = 2$  مماس است؟



خط ممتاز در دانشگاه  
دانشگاه مردمی ترکیه

$$O/\alpha = \frac{F}{r} = r$$

$$O/\beta = \frac{-4}{r} = -1$$

$$\beta = \frac{-4}{r} = -\mu$$


$$R^r = f + q - o \rightarrow R = \sqrt{1^{\mu}}$$

$$x - y + m - r = 0 \quad \rightarrow \quad L = \frac{|r + q + m - r|}{\sqrt{r + q}}$$

$$\begin{cases} |l+m| = 1/\mu \\ m+|l|=1/\mu \end{cases} \rightarrow m = \gamma \quad \checkmark$$

$$m+|l|=-1/\mu \rightarrow m = -\gamma \quad \checkmark$$

۱۶- معادلهی کوتاه‌ترین وتر از دایره  $x^2 + y^2 + 4x + 2y - 4 = 0$  می‌گذرد کدام است؟



$$MN \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = 1 \\ m = -\frac{1}{r} \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \alpha = \frac{-r}{r} = -1 \\ \beta = \frac{-r}{r} = -1 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} m = \frac{1 - (-1)}{-1 - (-1)} = \frac{2}{0} = \infty \\ \text{OA} = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\therefore y - 1 = \frac{-1}{r}(x + 1)$$

$$\begin{array}{l} \cancel{x} \\ \cancel{y} - 1 = -x - 1 \\ \cancel{y} + x = 1 \end{array}$$